

Septofort 2 mg

Písomná informácia pre používateľov

Septofort 2 mg

(chlorhexidini digluconas)

Tvrdé pastilky

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, Třinec, Česká republika

Zloženie lieku:

Liečivo: chlorhexidini digluconas 2 mg v 1 pastilke.

Pomocné látky: sorbitolum (sorbitol), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), maydis amylum (kukurिčný škrob), viride compositum 757 (zelená 757), magnesii stearas (magnéziumstearát), aspartamum (aspartam).

Farmakoterapeutická skupina: Otorinolaryngologikum

Charakteristika: Pastilky s príchuťou mäty na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana. Liek neobsahuje cukor a je vhodný pre diabetikov.

Indikácie: Liek je určený na prevenciu a lokálnu liečbu infekcií ústnej dutiny a horných dýchacích ciest (afty, zápalý d'asien, jazyka, nosohltana, stavy po operáciách v dutine ústnej alebo v hltane, po extrakciách zubov, erózie sliznice ústnej dutiny rôzneho pôvodu a pod.). Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 5 rokov.

Kontraindikácie: Liek nesmú používať pacienti precitlivení na chlorhexidín, sorbitol, aspartam alebo chorí s fenylketonúriou. Tehotné a dojčiacie ženy môžu liek používať iba so súhlasom ošetrojúceho lekára. Nepodávať deťom do 5 rokov.

Nežiaduce účinky: Po dlhšom užívaní lieku sa môže vyskytnúť prechodné žltohnedé sfarbenie zubov a jazyka, dočasná porucha chuti a pálenie jazyka, ktoré po ukončení liečby vymiznú. U osôb precitlivených na sorbitol môže liek vyvolať hnačku, ktorá po ukončení liečby vymizne. Pri výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií, prerušte užívanie lieku a poraďte sa s lekárom. Precitlivenosť sa môže prejaviť náhle vzniknutým opuchom tváre, poruchou dýchania, vyrážkou a svrbením kože. V tomto prípade okamžite prerušte užívanie lieku a vyhľadajte lekára.

Interakcie: Účinky chlorhexidínu a látok obsiahnutých v zubných pastách sa môžu navzájom rušiť, a preto je potrebné používať zubné pasty a Septofort 2 mg s časovým odstupom.

Dávkovanie a spôsob podávania: V prípade, že lekár neurčí inak, užívajú dospelí 3 krát denne 1 pastilku po jedle. Pastilky sa nechajú voľne rozplynúť v ústach. Deťom od 5 do 12 rokov sa podáva 2x denne ½ až 1 pastilka. Deťom od 12 rokov a mladistvým sa podáva 3x denne jedna pastilka. Po použití pastilky sa nesmie jesť a piť asi 1 až 2 hodiny. Rovnako ako jedlo, tak aj zubná pasta, môže rušiť účinok lieku, preto medzi použitím pastilky a čistením zubov musí uplynúť najmenej ½ hodiny. Príznaky zápalu sa zmiernia a vymiznú spravidla počas niekoľkých dní, napriek tomu je potrebné v používaní pastiliek pokračovať 2-3 dni, aby sa predišlo recidívam.

Upozornenie: O vhodnosti súčasného užívania lieku Septofort 2 mg s inými liekmi sa poraďte s lekárom. Pokiaľ sa do 3 dní nepozoruje výrazné zlepšenie alebo dokonca dôjde k zhoršeniu stavu, vyhľadajte lekára. U detí s horúčkou sa vždy poraďte s lekárom už na začiatku ťažkostí. Liek nepodávajte deťom mladším ako 5 rokov kvôli riziku vdýchnutia pastilky. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieraťom vyhľadajte lekára.

Varovanie: Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Liek uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávanie: Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C na suchom mieste, chrániť pred vlhkom a svetlom.

Balenie: 12, 24 pastiliek

Dátum poslednej revízie: august 2006

W 6100,6117/L/06W/SLO